


Home care instructions



Follow these instructions for home care after ATRIDOX® treatment

- Do not brush or floss the treated area for seven days.
- Your dentist may prescribe or recommend an oral rinse to use during the seven days following ATRIDOX application - the time when you can't brush or floss.
- Do not be alarmed if small amounts of ATRIDOX are dislodged. ATRIDOX is harmless if swallowed.
- As your gums heal and swelling begins to subside, they may recede a bit and you may notice some "white material" at the gumline. It is the ATRIDOX your dentist applied and most of it will dissolve and be absorbed within 28 days.

What is ATRIDOX?

ATRIDOX is an antibiotic gel that is placed gently into your gum pockets where bacteria thrive. It then quickly solidifies to a wax-like substance, slowly releasing the antibiotic to the infected area for 21 days.¹

How does ATRIDOX work?

ATRIDOX contains an antibiotic, doxycycline hyclate. The antibiotic is slowly released into the surrounding infected tooth pocket for 21 days.¹ This antibiotic works to kill the bacteria that are associated with periodontal disease. In studies, ATRIDOX has been shown to improve the health of your gums and to help stop the progression of the gum disease.



Does ATRIDOX cause any side effects?*

Side effects seen with ATRIDOX are similar to those seen with placebo. Side effects may include headache; common cold; gum discomfort, pain or soreness, loss of attachment, increase in pocket depth; toothache, pressure sensitivity; periodontal abscess, exudates, infection, drainage, extreme mobility, suppuration; thermal tooth sensitivity. Contact your dentist about any unusual discomfort.

What can I do to help prevent periodontal disease from recurring?

After seven days, brush and floss as your dental professional recommends. Also, it is important to follow the periodic maintenance schedule your dentist has prescribed.

PATIENT NAME _____

DATE TREATED _____ NEXT APPOINTMENT _____

*You are encouraged to report negative side effects of prescription drugs to the FDA. Visit www.fda.gov/medwatch, or call 1-800-FDA-1088. References: 1. Stoller N, Johnson L, Trapnell S, et al. The pharmacokinetic profile of a biodegradable controlled release delivery system containing doxycycline compared to systemically delivered doxycycline in gingival crevicular fluid, saliva and serum. *J Periodontol.* 1998;69:1085-1091.


ATRIDOX is a registered trademarks of TOLMAR, Inc. © 2010 Zila, Inc. TSM150 Rev. 1 0810



ATRIDOX
(doxycycline hyclate) 10%
www.atridox.com



Instrucciones para el cuidado en su hogar



Siga estas instrucciones para el cuidado en su hogar después del tratamiento con ATRIDOX®

- No cepille ni pase hilo dental por la zona tratada durante siete días.
- Su dentista puede prescribirle o recomendarle un enjuague bucal para utilizar durante los siete días posteriores a la aplicación de ATRIDOX, periodo en el cual usted no puede cepillarse los dientes o pasar el hilo dental.
- No se alarme si observa que pequeñas cantidades de ATRIDOX se desprenden. ATRIDOX no es nocivo a la salud en caso de ingestión.
- A medida que las encías se curan y la inflamación empieza a ceder, es posible que observe una pequeña retracción, y tal vez note que hay algo de “material blanco” en la línea gingival. Es el ATRIDOX que ha aplicado su dentista, y la mayor parte del mismo se disolverá, y será absorbido en el término de 28 días.

¿Qué es ATRIDOX?

ATRIDOX es un antibiótico en gel que se coloca suavemente en las bolsas de la encía donde proliferan las bacterias. Este producto solidifica rápidamente en la forma de una cera, liberando lentamente el antibiótico a la zona infectada por 21 días.¹

¿Cómo actúa ATRIDOX?

ATRIDOX contiene un antibiótico llamado hclato de doxiciclina. Este antibiótico se libera lentamente alrededor de la bolsa del diente infectado por 21 días.¹ Este antibiótico actúa matando las bacterias asociadas con la enfermedad periodontal. En los estudios realizados, ATRIDOX ha demostrado mejorar la salud de sus encías, y ayudar a detener el avance de la gingivitis.



¿Tiene ATRIDOX efectos secundarios?*

Los efectos secundarios de ATRIDOX son similares a los que se ven con un placebo. Es posible que se presenten dolores de cabeza, resfriados, molestias, dolor o dolencias en las encías, pérdida de fijación, aumento de la profundidad de la cavidad, dolor de muelas, sensibilidad a la presión, absceso, secreción, infección, drenaje, movilidad extrema, supuración periodontal, sensibilidad dental al frío y al calor. Comuníquese con su dentista si siente una molestia que no sea habitual.

¿Qué puedo hacer para prevenir la recurrencia de una gingivitis?

Después de siete días, cepílese los dientes y pase el hilo dental, siguiendo las recomendaciones de su dentista. También es importante seguir el horario de mantenimiento periódico que su dentista han prescrito.

NOMBRE DEL PACIENTE _____

DIA DEL TRATAMIENTO _____ PRÓXIMA CONSULTA _____

*Reporte efectos secundarios adversos de medicamentos con receta al FDA Visite fda.gov/medwatch, o llame al 1-800-FDA-1088.
References: 1. Stoller N, Johnson L, Trapnell S, et al. The pharmacokinetic profile of a biodegradable controlled release delivery system containing doxycycline compared to systemically delivered doxycycline in gingival crevicular fluid, saliva and serum. *J Periodontol.* 1998;69:1085-1091.

ATRIDOX
(doxycycline hyclate) 10%

www.atridox.com

